

LEPTOSPIRA

I. LÂM SÀNG

- Hội chứng NT-NĐ: Sốt đột ngột, rét run
- Đau cơ: Thường đau cơ bắp chân, bóp vào đau tăng
- Hội chứng da và niêm mạc: Cứng mạc mắt xung huyết đỏ rực, kết mạc mắt đỏ, xuất huyết đa dạng ở da
- Hội chứng gan thận: Gan to nhẹ, vàng da, vàng mắt .

* **Xét nghiệm** Ure và Creatinin máu tăng
 CTM: bạch cầu máu tăng

* **Yếu tố dịch tễ** : Tính chất công việc: đào cống rãnh, súc vật cắn

II. ĐIỀU TRỊ

1. Kháng sinh chống nhiễm trùng:

- Đặc hiệu: Penicillin G 80- 90000UI/kg/24h chia 4 lần trong 7-10 ngày(TM)

Hoặc: Doxycyclin 2-3mg/kg/24h, 2 lần/24h x 7 ngày

- Cephalosporin III:Cũng được khuyến cáo sử dụng tuy nhiên không hiệu quả bằng Penicillin,Doxycilin

2. Điều trị triệu chứng

- Bồi phụ nước – điện giải
- Hạ nhiệt khi sốt cao
- Chống suy thận.
- Chống suy chức năng gan: các loại bổ gan, lợi mật